

BOSQUE RIBEREÑO



Bosque ribereño, fluvial, galería o franja son distintas denominaciones que se usan para caracterizar a un mismo tipo de bosque, el que se ubica en torno a un curso de agua.

Factores de mayor incidencia en su composición florística: tipo de cauce, clima, suelo, intrusiones, etc.

Estructura general de estos bosques:

- + Distribución de especies en función del gradiente de humedad: hidrófilas, subhidrófilas, mesoxerófilas.
- + Distintos estratos de un bosque: superior, medio, inferior.



Inga vera subsp. *affinis* "Ingá"





Salix humboldtiana "Sauce criollo"



Sapium glandulosum “Curupí”



Allophyllus edulis "Chal-chal"



Eugenia uniflora “Pitanga”



Myrrhinium atropurpureum var. *octandrum*
“Palo de fierro” “Socará”

13

Senna corymbosa "Rama negra"



Celtis tala “Tala”





Macfadyena unguis-cati “Uña de gato”

Zonación geográfica:

- + Bosques del sur, del norte, de la Cuenca de la Laguna Merín, del litoral.
- + Especies destacadas en cada zona.




Image © 2005 EarthSat

© 2005 Google





Sesbania punicea “Acacia mansa”



Río Cebollatí



Calliandra tweedii "Plumerillo rojo"



Erythrina cristagalli "Ceibo"



Erythrina cristagalli var. *leucochlora* "Ceibo blanco"



Vitex megapotamica “Tarumán sin espinas”





Caesalpinia gilliesii "Barba de chivo"



Calliandra brevipes "Plumerillo rosado"



Isla del Zapallo (Artigas)





Combretum fruticosum



Psychotrya carthagenensis "Naranjillo"



Bambusa chacoensis “Tacuaruzú”



Peltophorum dubium "Ibirapitá"







Tabebuia heptaphylla "Lapacho"

