


Aves de la Ciudad


Darwin viene a la ciudad

Washington Jones - Sección Ornitología





Late afternoon temperature °C





Corredores ecológicos urbanos







Maulan, S., Shariff, M. K., & Miller, P. (2006). Landscape preference and human survival well-being. *Sustainable Tropical Design Research and Practice*, 1, 24-31.



Roger Ulrich (1984). View through a window may influence recovery from surgery. *Science* 224, 420–421.


Roger Ulrich et al. (1991). Stress recovering during exposure to natural and urban environments. *Journal of Environmental Psychology* 11:201-230.



Hedblom et al. (2014)









Cobar, A.G.C., Borromeo, M.C., Agcaoili, J.K., y A.M.T. Rodil. 2017. Acute effect of birdwatching on mood states of senior high school students in the physical education setting. *Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science, Movement & Health* 17: 18-25.






Ñandú (*Rhea americana*)


Paloma de Monte (*Patagioenas picazuro*)




Torcacita Común (*Columbina picui*)



**Torcaza (*Zenaida auriculata*) –
Plaga Nacional**




Zorzal Común (*Turdus rufiventris*)



Sabiá (*Turdus amaurochalinus*)



Tordo Común (*Molothrus bonariensis*)



Hornero (*Furnarius rufus*)



Cotorra Común (*Myiopsitta monachus*) – Plaga Nacional





Catita chirii (*Brotoogeris chiriri*)



Gavilán Mixto (*Parabuteo unicinctus*)



Chimango (*Caracara plancus*)





**Lechuza de
Campanario
(*Tyto alba*)**



**Tamborcito
(*Megascops choliba*)**






Pirincho Común (*Guira guira*)

Gallineta Grande
(*Aramides ypecaha*)






Burrito Enano (*Coturnicops notatus*)



Aguatero (*Nycticryphes semicollaris*)



Gallareta grande (*Fulica armillata*)




Macá Común (*Rollandia rolland*)



Cuervillo de Cañada
(*Plegadis chihī*)


Cuervillo Cara Pelada
(*Phimosus infuscatus*)




Picaflor verde (*Chlorostilbon lucidus*)



**Ratonera Común
(*Troglodytes aeodon*)**



Carpintero Nuca Roja
(*Colaptes melanochlorus*)



Carpinterito manchado
(*Dryobates spilogaster*)



Trepador Grande
(*Drymornis bridgesii*)



Calandria Común (*Mimus saturninus*)



Benteveo (*Pitangus sulphuratus*)



Chingolo Común (*Zonotrichia capensis*)



Gorrión Común (*Passer domesticus*)
Plaga Nacional-Introducido siglo XIX o 1900 (Colonia)-
Introducción en Bs.As (1872 o 1873)



Paloma de plaza (*Columba livia*) – Plaga Nacional –desde colonización europea



Verderón (*Chloris chloris*):
Introducida a
finales de siglo
XIX



**Cardelino (*Carduelis carduelis*)-Introducción posterior
a Verderón (1960s?)**



**Pico de Lacre (*Estrilda astrild*)-
introducido por Brasil XIX**



Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*)-década del 80's desde Buenos Aires





Parque Vaz Ferreira-Cerro de Montevideo



Parque del MUME



Parque del Palacio Mendilaharsu



Punta Carretas



Parque Batlle



Parque Rodó



Parque Rivera



Parque lineal Arq. E. Baroffio



Puerto del Buceo



Bañados de Carrasco



Arroyo Miguelete- El Prado



Jardín Botánico

Muchas gracias!!

“Nada vemos de estos cambios lentos y progresivos hasta que la mano del tiempo ha marcado el transcurso de las edades”

Charles Darwin

El origen de las especies (1859)

“I took much pleasure in watching the habits of birds, and even made notes on the subject. In my simplicity, I remember wondering why every gentleman did not become an ornithologist.”