



Frutales en la huerta

Equipo Técnico Agricultura Urbana Montevideo Rural



Intendencia
Montevideo




Propagación de frutales

Propagación sexual

- **Vitis: 1-2 años**
- **Prunus: 2-8 años**
- **Malus: 4-8 años**
- **Citrus: 4-8 años**

JUVENILIDAD



Almacenamiento
Variabilidad genética

Propagación asexual

• **Vitis: 1-2 años**

• **Prunus: 2-8 años**

• **Malus: 4-8**

• **Citrus: 4**

JUVENILIDAD




**Acelerar el ciclo de
producción**

Propagar clones

Principal estrategia en árboles frutales

INJERTO

Combinación de
2 individuos



Acelerar el ciclo de producción

Propagar clones

Obtener beneficios
portainjerto

INJERTO



Cambio de copa

Reparar plantas dañadas

Beneficios de portainjertos

Relevancia Vid


Filoxera de la Vid
Dactylasphaera vitifoliae





Beneficios de portainjertos

Relevancia Manzano

Portainjertos Enanizantes



Seedling



Beneficios de portainjertos

Relevancia Duraznero Tolerancia al anegamiento



Obtención del portainjerto: **SEXUAL**

Método estándar Duraznero



Obtención del portainjerto: **SEXUAL**

Método estándar Cítricos






Obtención del portainjerto: **ASEXUAL** **POR ESTACAS**

Tradicional Vid



Obtención del portainjerto: **ASEXUAL** **ACODO**


Estándar Manzano



Obtención del portainjerto: **ASEXUAL** **ACODO**





Obtención de la copa: **INJERTO**



Buen contacto cambium

No hay contacto




Obtención de la copa: **INJERTO**



Obtención de la copa: **INJERTO** **DE YEMA**



Obtención de la copa: **INJERTO** **DE PÚA/CUÑA**



Obtención de la copa: **INJERTO**

YEMA DORMIDA

YEMA DESPIERTA



AGROLOGICA



AGROLOGICA







Gracias

¿Preguntas?



Intendencia
Montevideo

